

RESUMO

DEPRESSÃO PÓS-PARTO

Orientadora Gladys Rodrigues Juarez

GABRIELA LACERDA

Historicamente o puérperio é reconhecido como um momento crítico e de alto risco emocional e por isso as chances da mulher adoecer emocionalmente nessa fase de sua vida são maiores do que em outras épocas . Conforme se evidencia na literatura eventos estressantes podem ocasionar como conseqüências, os transtornos psiquiátricos. Devido as características do período puerperal, observa-se um maior risco de surgimento destes distúrbios. Os distúrbios psiquiátricos puerperais se classificam em Depressão Puerperal, Psicose Puerperal e Tristeza Pós-Parto que se diferem entre si em diversos aspectos. Esta pesquisa discutirá acerca dos transtornos psíquicos puerperais, com ênfase na Depressão Puerperal. A Depressão Puerperal é um transtorno mental de alta prevalência e que provoca alterações emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas. A sua etiologia é determinada por uma combinação de fatores que devem ser abordados no diagnóstico e terapêutica. O quadro depressivo puerperal surge na maioria das vezes, nas duas primeiras semanas após o parto. A Depressão Pós-Parto é uma síndrome psiquiátrica importante que em geral repercute na interação mãe-filho e praticamente de forma negativa e promove um desgaste progressivo na relação com os familiares. A saúde mental é um componente fundamental da saúde humana, portanto promovê-la é um dever dos profissionais envolvidos no cuidado humano.

Palavras-chaves: depressão-parto-mulher.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.